

Vorbereitung zur Darmspiegelung mit

PLENVUE



FACHARZTZENTRUM
SELTERSBERG

Am:

um: Uhr

Ein optimal gereinigter Darm ist der wichtigste Beitrag für eine angenehme und erfolgreiche Untersuchung

Untersuchungstermin 8:00 bis 10:00

Am Tag vor der Untersuchung

Bis 14:00 Uhr nur flüssige oder breiige Kost (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot).

Um ca. 18:00 Uhr trinken Sie die 1. Dosis PLENVU(Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt des Beutels mit Dosis 1 in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

1 Stunde Pause.

Um ca. 20:00 Uhr trinken Sie die 2. Dosis PLENVU (Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.

Untersuchungstermin ab 10:00 bis 14:00

Am Tag vor der Untersuchung

Bis 16:00 Uhr nur flüssige oder breiige Kost (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot)

Um ca. 20:00 Uhr trinken Sie die 1. Dosis PLENVU(Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt des Beutels mit Dosis 1 in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

Am Untersuchungstag

Vier Stunden vor der Untersuchung trinken Sie die 2. Dosis PLENVU (Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.

Untersuchungstermin ab 14:00

Am Tag vor der Untersuchung

Nehmen Sie nur ein flüssiges oder breiiges Abendbrot zu sich (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot)

Am Untersuchungstag

Um ca. 8:00 Uhr (spätestens sechs Stunden vor dem Untersuchungstermin) trinken Sie die 1. Dosis PLENVU(Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt des Beutels mit Dosis 1 in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

1 Stunde Pause.

Um ca. 10:00 Uhr (spätestens vier Stunden vor dem Untersuchungstermin) trinken Sie die 2. Dosis PLENVU (Pulver) innerhalb von 30 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 500 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.

Tipps zur angenehmeren Einnahme:

Mit einem Strohhalm trinken

Im Wechsel mit anderen Getränken trinken

Zitronenscheibe kurz vor dem Trinken lutschen

Gekühlt trinken

Bitte bringen Sie zur Untersuchung einen Bademantel oder ein großes Handtuch mit.

Medikamente können in der Regel wie bisher eingenommen werden. Informieren Sie uns aber, ob Sie Medikamente zur Blutverdünnung oder gegen Diabetes einnehmen, da die Einnahme unter Umständen verändert werden muss.

Manchmal kann es durch das Abführen zu einer harmlosen Hautreizung am After kommen. Das Auftragen einer Hautschutzcreme hilft dann effektiv.

Im Falle, dass Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns unbedingt spätestens 48 Stunden vor der Untersuchung. Ansonsten entstehen Ihnen unnötige Kosten und für andere Patienten Wartezeiten

Ihr

