

Bitte bringen Sie zur Untersuchung ein **großes Handtuch** mit.

Medikamente können in der Regel wie bisher eingenommen werden. Informieren Sie uns aber, ob Sie Medikamente zur Blutverdünnung oder gegen Diabetes einnehmen, da die Einnahme unter Umständen verändert werden muss.

Manchmal kann es durch das Abführen zu einer harmlosen Hautreizung am After kommen. Das Auftragen einer Hautschutzcreme hilft dann effektiv.

Im Falle, dass Sie Ihren Termin nicht wahrnehmen können, informieren Sie uns unbedingt spätestens 48 Stunden vor der Untersuchung. Ansonsten entstehen Ihnen unnötige Kosten und für andere Patienten Wartezeiten.

Tel.: 0641 / 330 550 50

Email: [info@fas-giessen.de](mailto:info@fas-giessen.de)



Vorbereitung zur Darmspiegelung mit Moviprep

Am:

Um:

Ein optimal gereinigter Darm ist der wichtigste Beitrag für eine angenehme und erfolgreiche Untersuchung

Bereits **3 Tage vor der Untersuchung** essen Sie bitte keine Obst- und Gemüsesorten mit kleinen Kernen (z.B. Weintrauben, Kiwi, Tomaten, Gurken) sowie keine Füll- und Quellmittel (Weizenkleie usw.). Verzichten Sie bitte auch auf ballaststoffreiche Kost (Vollkornbrot, Müsli).

**2 Tage vor der Untersuchung** (auch unmittelbar nach der Untersuchung empfehlenswert) nehmen Sie leichte, wenig blähende Kost zu sich, wie mageres Rindfleisch, Geflügel, Reis und auch Teigwaren. Verzichten Sie auf viel Obst und Gemüse, Hülsenfrüchte, Milchprodukte, Schwarzbrot, Kohl, Kürbis, Zwiebeln, Knoblauch.

Je nach Uhrzeit der geplanten Koloskopie beginnen Sie mit der eigentlichen Darmvorbereitung mit dem Medikament.

### **Untersuchungstermin zwischen 8:00 Uhr und 10:00Uhr**

#### **Am Tag vor der Untersuchung**

Bis 14:00 Uhr nur flüssige oder breiige Kost (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot).

Um ca. 18:00 Uhr trinken Sie die 1. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 1 Beutel A und Dosis 1 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

#### **1 Stunde Pause.**

Um ca. 20:30 Uhr trinken Sie die 2. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.

### **Untersuchungstermin zwischen 10:00 Uhr und 14:00 Uhr**

#### **Am Tag vor der Untersuchung**

Bis 16:00 Uhr nur flüssige oder breiige Kost (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot)

Um ca. 20:00 Uhr trinken Sie die 1. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 1 Beutel A und Dosis 1 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

#### **Am Untersuchungstag**

Vier Stunden vor der Untersuchung trinken Sie die 2. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.

### **Untersuchungstermin ab 14:00 Uhr**

#### **Am Tag vor der Untersuchung**

Nehmen Sie nur ein flüssiges oder breiiges Abendbrot zu sich (z.B. Kaffee, Quark, Pudding, Joghurt, Suppe, Brühe, etwas Toastbrot)

#### **Am Untersuchungstag**

Um ca. 8:00 Uhr (spätestens sechs Stunden vor dem Untersuchungstermin) trinken Sie die 1. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 1 Beutel A und Dosis 1 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

#### **1 Stunde Pause.**

Spätestens vier Stunden vor der Untersuchung trinken Sie die 2. Dosis Moviprep innerhalb von 60 Minuten (alle 10 – 15 Minuten 1 Glas). Dazu füllen Sie den Inhalt der Beutel mit Dosis 2 Beutel A und Dosis 2 Beutel B in 1000 ml Wasser und rühren um, bis das Pulver aufgelöst ist. Anschließend in den nächsten 30 Minuten nochmals mindestens 500 ml klare Getränke Ihrer Wahl (z. B. Wasser, Tee oder Softdrinks) trinken.

Am Ende muss leicht gelbliche Flüssigkeit (wie Kamillentee) ohne Rückstände ausgeschieden werden. Wenn das nicht der Fall ist, bitte unbedingt weiter frei gewählte Flüssigkeit trinken.

Bis zwei Stunden vor der Untersuchung können und sollten Sie weiter durchsichtige Getränke zu sich nehmen.